

thm_2Earithmetic_2ELESS__MOD
 (TMGerdeKKF-
 sKQpsPagkG9VQ8Ya4cQWAQFej)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{4}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Enum_2EABS_num ($

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{5}$$

Definition 5 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 6 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})ty_2Enum_2Enum) \quad (6)$$

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0n) V0n)$.

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EMOD \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})ty_2Enum_2Enum) \quad (7)$$

Definition 9 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 10 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_21 2) V0t)$.

Definition 12 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t) V1t2) V0t1))$.

Definition 13 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$ then $(the (\lambda x.x \in A \wedge P x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 14 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.^{27a} : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 A) P)))$.

Definition 15 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})ty_2Enum_2Enum) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ & ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V1n)))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)))))))))) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{10}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1k \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2r \in ty_2Enum_2Enum. ((\exists V3q \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (V1k = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V3q) V0n)) V2r)) \wedge (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V2r) V0n)))) \Rightarrow (\\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V1k) V0n) = V2r))))
\end{aligned} \tag{11}$$

Assume the following.

$$True \tag{12}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\
& p V0t))))))
\end{aligned} \tag{15}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1k \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V1k) V0n)) \Rightarrow ((ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD \\
& V1k) V0n) = V1k))))
\end{aligned}$$