

thm_2Earithmetic_2ELE__MULT__CANCEL__RBARE (TMX3CuNjwDuaQVPu1BwwCBsQs7Q7EAeY64o)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Enum_2EABS_num (ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{6}$$

Definition 5 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 6 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2E2A V0n) c_2Enum_2E0)$.

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21) 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$.

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21) 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (7)$$

Definition 12 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21) 2) (\lambda V0t \in 2.V0t)$.

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_21) V0t)$.

Definition 14 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if} (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 15 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40) P))$.

Definition 16 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.V1n$.

Definition 17 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.V1n$.

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n)))))))))) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow ((V0m = c_2Enum_2E0) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{9}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V2p) V1n))) \Leftrightarrow ((V1n = c_2Enum_2E0) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{10}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n)) V0m)) \Leftrightarrow ((V0m = c_2Enum_2E0) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V1n) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) V1n)) \Leftrightarrow ((V1n = c_2Enum_2E0) \vee \\
& \quad (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))))))
\end{aligned}$$