thm_2Earithmetic_2EMOD__TIMES__SUB (TMVQw2akts6jgf1hQuiw2QCQcuKaCBg3Pza)

October 26, 2020

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{3}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{4}$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ A$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{5}$$

Definition 9 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$ *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 10 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_7E}$ *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E}$

Definition 11 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C}$ *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 12 *We define* $\mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}$ *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enu$

Definition 13 *We define* $\mathsf{c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D}$ *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{6}$$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{7}$$

Let $c\_2Earithmetic\_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EMOD \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{9}$$

Definition 14 *We define* $\mathsf{c\_2Enum\_2E0}$ *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Assume the following.

$$((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0n) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\wedge(\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1m))\ V2n) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ V1m)\ V2n))\ V2n))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.((V0m = \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\vee(\exists V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(V0m = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0c \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1b \in ty\_2Enum\_2Enum.((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D}\ V0c)\ V1b))\Rightarrow(\forall V2a \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V2a)\ V1b))\ V0c) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V2a)\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ V1b)\ V0c))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0n))\Rightarrow(\forall V1q \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2r \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EMOD\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ V1q)\ V0n))\ V2r))\ V0n) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EMOD\ V2r)\ V0n)))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$True \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow(p\ V1t2))\Rightarrow(((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V0t1))\Rightarrow((p\ V0t1)\Leftrightarrow(p\ V1t2)))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False\Rightarrow(p\ V0t))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\wedge True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow False)\wedge((((p\ V0t)\wedge False)\Leftrightarrow False)\wedge(((p\ V0t)\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Rightarrow True)\Leftrightarrow True)\wedge(((False\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge((((p\ V0t)\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge(((p\ V0t)\Rightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x)\Leftrightarrow True)) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\neg(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ V0n)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})))) \tag{22}$$

Theorem 1

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1q \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2r \in ty\_2Enum\_2Enum.(((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0n))\land((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V1q))\land(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D}\ V2r)\ V0n))))\Rightarrow((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EMOD\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ V1q)\ V0n))\ V2r))\ V0n) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EMOD\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ V0n)\ V2r))\ V0n))))))$$