thm_2Ebool_2ECOND_RAND
(TMQv3K5dTpQUB6VyQYt8cY4214g77sQoaCF)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21$\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$
of type ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21$\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.(ap$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A\_27a.(\forall V1t2 \in$$
$$A\_27a.(((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A\_27a)\ c_2Ebool_2ET)\ V0t1)$$
$$V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A\_27a)\ c_2Ebool_2EF)$$
$$V0t1)\ V1t2) = V1t2))))$$

$$(1)$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ($$
$$\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1b \in 2.(\forall V2x \in A\_27a.$$
$$(\forall V3y \in A\_27a.((ap\ V0f\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A\_27a)$$
$$V1b)\ V2x)\ V3y)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A\_27b)\ V1b)\ (ap\ V0f$$
$$V2x))\ (ap\ V0f\ V3y)))))))$$