thm_2Ebool_2EboolAxiom (TMc79G2bstX9F9zJxBN8GfsQ4umARuAFbTZ)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj__o\ (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40 A

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^{A_27a}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj__o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$
of type ι.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(a$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a.(\forall V1t2 \in A_27a.(((ap\ (ap\ (ap\ ($c_2Ebool_2ECOND $A_27a)$ c_2Ebool_2ET$)\ V0t1)\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ ($c_2Ebool_2ECOND $A_27a)$ c_2Ebool_2EF$)\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))) \tag{1}$$

Theorem 1

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a.(\forall V1t2 \in A_27a.(\exists V2fn \in (A_27a^2).(((ap\ V2fn\ c_2Ebool_2ET) = V0t1) \wedge ((ap\ V2fn\ c_2Ebool_2EF) = V1t2)))))$$