thm_2Ebool_2Eliteral__case__RAND (TMVG-mGw2BwhYEqqP4j7D9g8QSn4de1pnUum)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj__o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2Eliteral__case *to be* $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).(\lambda V1x \in$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\text{c_2Emin_2E_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ (\text{c_2Emin_2E_3D}\ (2^{A_27}$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27b^{A_27a}).(\forall V1x \in A_27a.((ap\ (ap\ (\text{c_2Ebool_2Eliteral__case}\ A_27a\ A_27b)\ V0f)\ V1x) = (ap\ V0f\ V1x)))) \quad (1)$$

Theorem 1

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow \forall A_27c.\ nonempty\ A_27c \Rightarrow (\forall V0P \in (A_27c^{A_27b}).(\forall V1N \in (A_27b^{A_27a}).\ (\forall V2M \in A_27a.((ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\text{c_2Ebool_2Eliteral__case}\ A_27a\ A_27b)\ (\lambda V3x \in A_27a.(ap\ V1N\ V3x)))\ V2M)) = (ap\ (ap\ (\text{c_2Ebool_2Eliteral__case}\ A_27a\ A_27c)\ (\lambda V4x \in A_27a.(ap\ V0P\ (ap\ V1N\ V4x))))\ V2M)))))$$