

thm\_2EintExtension\_2EINT\_\_GT\_\_RMUL\_\_EXP  
 (TMFU-  
 jqe6KaKBnJacSasxSDSMVsCRKaL1JyG)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)))$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (1)$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod \\ A0\ A1) \end{aligned} \quad (2)$$

Let  $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Einteger\_2Eint \quad (3)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{ty\_2Einteger\_2Eint}) \quad (4)$$

**Definition 3** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap P x)) \text{ then } (\lambda x. x \in A \wedge p$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a}))$

**Definition 5** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint. (ap (c\_2Emin\_2E\_40 (ty$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (5)$$

**Definition 6** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint. \lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint.$

**Definition 7** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_gt$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \lambda V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (6)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (7)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)}} \quad (8)$$

**Definition 8** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum).$

**Definition 9** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint. \lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint.$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (9)$$

Let  $c\_2Enum\_2EAbs\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EAbs\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \quad (10)$$

**Definition 10** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap c\_2Enum\_2EAbs\_num c\_2Enum\_2EZERO\_REP).$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (11)$$

**Definition 11** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj\_o (p \Rightarrow p \ Q)$  of type  $\iota$ .

Assume the following.

$$True \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (13)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in A\_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0y \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
 & ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V1x) V0y) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
 & V0y) V1x)))) \\
 \end{aligned} \tag{15}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
 & (\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
 & (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \Rightarrow ((p (ap ( \\
 & ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) \\
 & V1y)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
 & V1y) V2z))))))) \\
 \end{aligned} \tag{16}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1b \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
 & (\forall V2n \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
 & (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V2n)) \Rightarrow ((p (ap ( \\
 & ap c\_2Einteger\_2Eint\_gt V0a) V1b)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_gt \\
 & (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0a) V2n)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
 & V1b) V2n)))))))
 \end{aligned}$$