

thm\_2Eint\_\_arith\_2Ele\_\_context\_\_rwt5  
(TMJ8JQ5xoAgWXi1GxoqyPiMrdkapKopMLPd)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p \Rightarrow P \Rightarrow Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a}))$

**Definition 5** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2EF$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Einteger\_2Eint \tag{3}$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})\ ty\_2Einteger\_2Eint) \tag{4}$$

**Definition 7** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 8** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap (c\_2Emin\_2E\_40 (ty$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum) \quad (5)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_eq \in ((2\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)) \quad (6)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{(2\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))} \quad (7)$$

**Definition 9** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)$

**Definition 10** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint$

**Definition 11** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (8)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum)^{\omega} \quad (9)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (10)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_neg \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)) \quad (11)$$

**Definition 13** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ c\_2Einteger\_2Eint$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_lt \in ((2\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)) \quad (12)$$

**Definition 14** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint$

**Definition 15** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_le$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint$

Assume the following.

$$True \quad (13)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.(\forall V1y \in A.27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (15)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) V1y)) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V1y)))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x)) = V0x)) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V0x) V0x))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.(((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V1y) V0x)))) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V1y) V0x)))))) \quad (22)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & (\forall V0c \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\ & ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\ & c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0c) V1x))) \Rightarrow ((p \\ & (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\ & c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\ & V0c)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V1x)))) \Leftrightarrow ((ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\ & c\_2Enum\_2E0) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0c) V1x)))))) \end{aligned}$$