

thm_2Einteger_2EINT__GE__CALCULATE
(TMa-
KiCFXp32HNdYWWkc1CZPG8Z5QiWg497D)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \tag{3}$$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})_{ty_2Einteger_2Eint}) \tag{4}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A$. **if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o\ (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2)))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x)$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A-27a}))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))\ (\lambda V2x \in 2.V2x)))$

Definition 5 We define $c_2Einteger_2Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)))$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)}) \tag{5}$$

Definition 6 We define $c_Einteger_Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1T2 \in ty_Einteger_Eint.$

Definition 7 We define c_Ebool_EF to be $(ap (c_Ebool_E21) 2) (\lambda V0t \in 2.V0t)$.

Definition 8 We define $c_Emin_E3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 9 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E3D_3D_3E V0t) c_Ebool_EF))$

Definition 10 We define $c_Einteger_Eint_le$ to be $\lambda V0x \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1y \in ty_Einteger_Eint.$

Definition 11 We define $c_Einteger_Eint_ge$ to be $\lambda V0x \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1y \in ty_Einteger_Eint.$

Theorem 1

$$(\forall V0x \in ty_Einteger_Eint.(\forall V1y \in ty_Einteger_Eint. \\ ((p (ap (ap c_Einteger_Eint_ge V0x) V1y)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_Einteger_Eint_le V1y) V0x))))))$$