thm_2Eintegral_2EINTEGRABLE__DINT (TMZb-hHm8JGNVFtNyKc7RVJecr7g9XKH8KT9)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^{A_27a}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21$\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2EF

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21$\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 8 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40 A

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{1}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c\_2Eintegral\_2Eintegrable : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Eintegral\_2Eintegrable \in ((2^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2} \tag{3}$$

Let $c\_2Etransc\_2EDint : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Etransc\_2EDint \in (((2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax} \tag{4}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{5}$$

Definition 10 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Eintegral\_2Eintegral : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Eintegral\_2Eintegral \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2I} \tag{6}$$

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).((p\ (ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegrable\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0a)\ V1b))\ V2f)) \Leftrightarrow (\exists V3i \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(p\ (ap\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2EDint\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0a)\ V1b))\ V2f)\ V3i))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V1b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).((ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegral\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0a)\ V1b))\ V2f) = (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ (\lambda V3i \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2EDint\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0a)\ V1b))\ V2f)\ V3i))))))) \tag{10}$$

Theorem 1

$$(\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegrable\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0f)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2EDint\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0f)\ (ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegral\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0f)))))))$$