thm_2Eiterate_2ENSUM__ADD (TMNUdtqR-RQNKgefc79ngEvTmZyLf6K9JTkU)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2EF$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 10 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 11 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 12 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 13 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap$ (c_2Ebool_2E_21 (2

Definition 14 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 15 *We define* c_2Eiterate_2Eneutral *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap$ (c_2Emin

Definition 16 *We define* c_2Eiterate_2Esupport *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda$

Definition 17 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 18 *We define* c_2Eiterate_2EITSET *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27b}).\lambda V$

Definition 19 *We define* c_2Eiterate_2Eiterate *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27b}).\lambda V$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{4}$$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{5}$$

Definition 20 *We define* c_2Eiterate_2Ensum *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap$ (c_2Eiterate_2Eiterate $A\_27a\ ty\_2Enum\_$

Definition 21 *We define* c_2Eiterate_2Emonoidal *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).(ap\ (ap$ c_2

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V2p) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V1n)\ V2p)) \Leftrightarrow (V0m = V1n))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$True \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0op \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Emonoidal}\ A\_27a)\ V0op)) \Rightarrow (\forall V1f \in (A\_27a^{A\_27b}).(\forall V2g \in (A\_27a^{A\_27b}). (\forall V3s \in (2^{A\_27b}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27b)\ V3s)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V3s)\ (\lambda V4x \in A\_27b.(ap\ (ap\ V0op\ (ap\ V1f\ V4x))\ (ap\ V2g\ V4x)))) = (ap\ (ap\ V0op\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V3s)\ V1f))\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Eiterate}\ A\_27b\ A\_27a)\ V0op)\ V3s)\ V2g))))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Emonoidal}\ ty\_2Enum\_2Enum)\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B)) \tag{17}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}). (\forall V1g \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(\forall V2s \in (2^{A\_27a}). ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V2s)) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Ensum}\ A\_27a)\ V2s)\ (\lambda V3x \in A\_27a.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ V0f\ V3x))\ (ap\ V1g\ V3x)))) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Ensum}\ A\_27a)\ V2s)\ V0f))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eiterate\_2Ensum}\ A\_27a)\ V2s)\ V1g)))))))$$