thm_2Elist_2EEXISTS__NOT__EVERY (TMaamVTf5TmNGP3VmnvghzmSA5a1Mte4beb)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{1}$$

Let $c\_2Elist\_2EEXISTS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EEXISTS\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(2^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \text{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \text{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $c\_2Elist\_2EEVERY : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EEVERY\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(2^{A\_27a})}) \tag{3}$$

Assume the following.

$$True \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t)))\wedge(((\neg True)\Leftrightarrow False)\wedge ((\neg False)\Leftrightarrow True))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x)\Leftrightarrow True)) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEVERY\ A\_27a)\ V0P)\ V1l))\Leftrightarrow(\neg(p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEXISTS\ A\_27a)\ (\lambda V2x \in A\_27a.\ (ap\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E\_7E}\ (ap\ V0P\ V2x))))\ V1l)))))) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEXISTS\ A\_27a)\ V0P)\ V1l))\Leftrightarrow(\neg(p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEVERY\ A\_27a)\ (\lambda V2x \in A\_27a.\ (ap\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E\_7E}\ (ap\ V0P\ V2x))))\ V1l)))))$$