thm_2Elist_2ELAST__compute (TMW9vJPxmHoNbg5iw5AT7puSWJEBJUVVLg6)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.(a$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{1}$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{2}$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{3}$$

Let $c\_2Elist\_2ELAST : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELAST\ A\_27a \in (A\_27a^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{4}$$

Assume the following.

$$True \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2ELAST\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a))\ V1t)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)))\ V0h)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELAST\ A\_27a)\ V1t))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0x \in A\_27a.((ap\ (c\_2Elist\_2ELAST\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0x)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) = V0x)) \land (\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2y \in A\_27a.(\forall V3z \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2ELAST\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V1x)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2y)\ V3z))) = (ap\ (c\_2Elist\_2ELAST\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2y)\ V3z))))))) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0x \in A\_27a.((ap\ (c\_2Elist\_2ELAST\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0x)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) = V0x)) \land (\forall V1h1 \in A\_27b.(\forall V2h2 \in A\_27b.(\forall V3t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).((ap\ (c\_2Elist\_2ELAST\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27b)\ V1h1)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27b)\ V2h2)\ V3t))) = (ap\ (c\_2Elist\_2ELAST\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27b)\ V2h2)\ V3t)))))))$$