thm_2Eoption_2Eoption__nchotomy (TMWuTxkP2Y3m4AQ3BuG4ChhA49HgXRHmuNH)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 6 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ A$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{1}$$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^2)}) \tag{3}$$

Definition 9 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS\_$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \tag{4}$$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \tag{5}$$

Definition 10 *We define* $\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_$

Definition 11 *We define* $\mathsf{c\_2Eone\_2Eone}$ *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ ty\_2Eone\_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty\_2Eone\_2$

Definition 12 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$ *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 13 *We define* $\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_7E}$ *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E}$

Definition 14 *We define* $\mathsf{c\_2Esum\_2EINR}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 15 *We define* $\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a)\ ($

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in A\_27a.((\forall V2x \in A\_27a.((V2x = V1t) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V2x)))) \Rightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_3F}\ A\_27a)\ V0P))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)}).(((p\ (ap\ V0P\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a))) \wedge (\forall V1a \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1a))))) \Rightarrow (\forall V2x \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V2x))))) \tag{7}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0opt \in (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a).((V0opt = (\mathsf{c\_2Eoption\_2ENONE}\ A\_27a)) \vee (\exists V1x \in A\_27a.(V0opt = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1x)))))$$