thm_2Epath_2EtoPath__11 (TMXr-rQc6HwWYhP4g86FHMLT7i8gTHrfmwVb)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2EF$

Let $ty\_2Ellist\_2Ellist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ A0) \tag{1}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty\_2Epath\_2Epath : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epath\_2Epath\ A0\ A1) \tag{3}$$

Let $c\_2Epath\_2EfromPath : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2EfromPath\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a)))^{(ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{4}$$

Let $c\_2Epath\_2EtoPath : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epath\_2EtoPath\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ (ty\_2Epair\_2Eprod} \tag{5}$$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in 2$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0a \in (ty\_2Epath\_2Epath\ A\_27a\ A\_27b).((ap\ (c\_2Epath\_2EtoPath\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (c\_2Epath\_2EfromPath\ A\_27a\ A\_27b)\ V0a)) = V0a)) \wedge (\forall V1r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a))).((p\ (ap\ (\lambda V2x \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a))).\mathsf{c\_2Ebool\_2ET})\ V1r)) \Leftrightarrow ((ap\ (c\_2Epath\_2EfromPath\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (c\_2Epath\_2EtoPath\ A\_27a\ A\_27b)\ V1r)) = V1r)))) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a))).(\forall V1r\_27 \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Ellist\_2Ellist\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27b\ A\_27a))).(((ap\ (c\_2Epath\_2EtoPath\ A\_27a\ A\_27b)\ V0r) = (ap\ (c\_2Epath\_2EtoPath\ A\_27a\ A\_27b)\ V1r\_27)) \Leftrightarrow (V0r = V1r\_27))))$$