

# thm\_2Erat\_2ERAT\_\_EQUIV\_\_NMR\_\_Z\_\_IFF (TMZqUVwjyc9dFzpbu8mcDhmjevhwD4NUYvJ)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a})) (\lambda V0P \in 2.V0P)) (\lambda V1P \in 2.V1P))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2EF))$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Einteger\_2Eint \tag{3}$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})\ ty\_2Einteger\_2Eint) \tag{4}$$

**Definition 8** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p x))$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 9** We define  $c\_Einteger\_Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_Einteger\_Eint.(ap (c\_Emin\_E40 (ty$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_lt \in ((2^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Eenum\_Eenum\ ty\_Eenum\_Eenum)})^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Eenum\_Eenum)}) \quad (5)$$

**Definition 10** We define  $c\_Einteger\_Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1T2 \in ty\_Einteger\_Eint$

**Definition 11** We define  $c\_Ebool\_E5C\_E2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E21\ 2) (\lambda V2t \in 2$

Let  $c\_Eenum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EZERO\_REP \in \omega \quad (6)$$

Let  $c\_Eenum\_EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EABS\_num \in (ty\_Eenum\_Eenum^{omega}) \quad (7)$$

**Definition 12** We define  $c\_Eenum\_E0$  to be  $(ap\ c\_Eenum\_EABS\_num\ c\_Eenum\_EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_Einteger\_Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_of\_num \in (ty\_Einteger\_Eint^{ty\_Eenum\_Eenum}) \quad (8)$$

Let  $ty\_Efrac\_Efrac : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_Efrac\_Efrac \quad (9)$$

Let  $c\_Efrac\_Erep\_frac : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Efrac\_Erep\_frac \in ((ty\_Epair\_Eprod\ ty\_Einteger\_Eint\ ty\_Einteger\_Eint)^{ty\_Efrac\_Efrac}) \quad (10)$$

Let  $c\_Epair\_ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_Epair\_Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (11)$$

**Definition 13** We define  $c\_Efrac\_Efrac\_dnm$  to be  $\lambda V0f \in ty\_Efrac\_Efrac.(ap (c\_Epair\_ESND\ ty\_Efrac\_Efrac\ f))$

Let  $c\_Epair\_EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_Epair\_Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (12)$$

**Definition 14** We define  $c\_Efrac\_Efrac\_nmr$  to be  $\lambda V0f \in ty\_Efrac\_Efrac.(ap (c\_Epair\_EFST\ ty\_Efrac\_Efrac\ f))$



Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\ & ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) V1y)) \Rightarrow (\neg(V0x = V1y)))))) \end{aligned} \quad (22)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\ & (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) V1y) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\ & c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow ((V0x = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \vee \\ & (V1y = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))))) \end{aligned} \quad (23)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & (\forall V0a \in ty\_2Efrac\_2Efrac. (\forall V1b \in ty\_2Efrac\_2Efrac. \\ & ((p (ap (ap c\_2Erat\_2Erat\_equiv V0a) V1b)) \Rightarrow (((ap c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr \\ & V0a) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow ((ap c\_2Efrac\_2Efrac\_nmr \\ & V1b) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))))) \end{aligned}$$