thm_2Ereal__topology_2EHOMEOMORPHIC__FINITENESS (TMN3ezVD3AevUUneN33D5vzxpSzVg95Z5Jk)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 3 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27a}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 8 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 9 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2$

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 11 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2EF})$.

Definition 12 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ (2$

Definition 13 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}$

Definition 15 *We define* c_2Epred__set_2ESURJ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in ($

Definition 16 *We define* c_2Epred__set_2EINJ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A}$

Definition 17 *We define* c_2Epred__set_2EBIJ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A}$

Definition 18 *We define* c_2Ecardinal_2Ecardeq *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0s1 \in (2^{A\_27a}).\lambda V1s2 \in (2^{A}$

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{4}$$

Let $c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehomeomorphism : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehomeomorphism \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal})\ (ty\_2Ereal} \tag{5}$$

Definition 19 *We define* c_2Ereal__topology_2Ehomeomorphic *to be* $\lambda V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).\lambda V1t \in (2$

Assume the following.

$$\begin{array}{c}\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\\ \forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecardinal\_2Ecardeq}\\ A\_27a\ A\_27b)\ V0s)\ V1t)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\\ V0s)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27b)\ V1t))))))\end{array} \tag{6}$$

Assume the following.

$$\begin{array}{c}(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1t \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).\\ ((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehomeomorphic}\ V0s)\ V1t)) \Rightarrow (p\ (\\ ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecardinal\_2Ecardeq}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\\ V0s)\ V1t)))))\end{array} \tag{7}$$

Theorem 1

$$\begin{array}{c}(\forall V0s \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1t \in (2^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).\\ ((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_\_topology\_2Ehomeomorphic}\ V0s)\ V1t)) \Rightarrow ((p\\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V0s)) \Leftrightarrow (p\ (ap\\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1t))))))\end{array}$$