thm_2Esum_2ENOT__ISR__ISL (TMSXy9vwAyLiRHWz7gMMg1tUGhGs9ytkDUs)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 6 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_40}\ A$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Esum\_2EISL : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EISL\ A\_27a\ A\_27b \in (2^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{2}$$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^2)}) \tag{3}$$

Definition 10 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda A\_27b:\iota.\lambda V0e\in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t\in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Definition 12 *We define* c_2Esum_2EINR *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda A\_27b:\iota.\lambda V0e\in A\_27b.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS$

Let $c\_2Esum\_2EISR:\iota\Rightarrow\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow c\_2Esum\_2EISR\ A\_27a\ A\_27b\in(2^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (4)$$

Assume the following.

$$True \quad (5)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1\in 2.(\forall V1t2\in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow(p\ V1t2))\Rightarrow(((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V0t1))\Rightarrow((p\ V0t1)\Leftrightarrow(p\ V1t2)))))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t\in 2.(False\Rightarrow(p\ V0t))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t\in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t)))\wedge(((\neg True)\Leftrightarrow False)\wedge((\neg False)\Leftrightarrow True))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t\in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0ss\in(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b).((\exists V1x\in A\_27a.(V0ss=(ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x)))\vee(\exists V2y\in A\_27b.(V0ss=(ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINR}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2y))))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow((\forall V0x\in A\_27a.(p\ (ap\ (c\_2Esum\_2EISL\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x))))\wedge(\forall V1y\in A\_27b.(\neg(p\ (ap\ (c\_2Esum\_2EISL\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINR}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1y)))))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow((\forall V0x\in A\_27b.(p\ (ap\ (c\_2Esum\_2EISR\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINR}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x))))\wedge(\forall V1y\in A\_27a.(\neg(p\ (ap\ (c\_2Esum\_2EISR\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Esum\_2EINL}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1y)))))) \quad (12)$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in (ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b).((\neg(p\ (ap\ (c\_2Esum\_2EISR\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (c\_2Esum\_2EISL\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x))))$$