thm_2Etc_2ENOT__IN__RDOM (TMGF-PYNw9CSxUa99pAwpVwcujnFyWyQ2uW9)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^{A_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 7 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2EF)$.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$\ V0t)$ c_2Ebool_2EF

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ ($c_2Emin_2E_40

Definition 12 *We define* c_2Erelation_2ERDOM *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).\lambda V1x$

Assume the following.

$$True \tag{1}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1x \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V1x)\ V0P)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ V0P\ V1x))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\neg (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a))))) \tag{7}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0Q \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1x \in A\_27a.(((ap\ V0Q\ V1x) = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)) \Leftrightarrow (\neg (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V1x)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Erelation\_2ERDOM}\ A\_27a\ A\_27a)\ V0Q)))))))$$