t14_rat_1 (TMS1ZdKgLZzBXgrRHX4dcLBDNGZAc1KVKM7)

October 27, 2020

Let $v1\_rat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_rat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_numbers : \iota$ be given. Let $v1\_xcmplx\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3\_xcmplx\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_xboole\_0 : \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_numbers : \iota$ be given. Let $v1\_xreal\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8\_real\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5\_numbers : \iota$ be given. Let $k4\_ordinal1 : \iota$ be given. Let $v3\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_xxreal\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_xxreal\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_int\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_rat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_real\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_xxreal\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_xxreal\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xcmplx\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(v1\_xcmplx\_0\ X1) \Rightarrow (\neg (k3\_xcmplx\_0\ X0\ X1 = k6\_numbers) \wedge ((X0 \neq k6\_numbers) \wedge (X1 \neq k6\_numbers)))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (X0 = k1\_xboole\_0) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ X0\ X1) \Leftrightarrow (m1\_subset\_1\ X2\ X1)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1\_subset\_1\ X0\ k1\_numbers) \wedge (v1\_xreal\_0\ X1)) \Rightarrow (k8\_real\_1\ X0\ X1 = k3\_xcmplx\_0\ X0\ X1) \tag{4}$$

Assume the following.

$$k6\_numbers = k1\_xboole\_0 \tag{5}$$

Assume the following.

$$k5\_numbers = k4\_ordinal1 \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\neg v1\_xboole\_0\ k4\_ordinal1)\wedge(v3\_ordinal1\ k4\_ordinal1) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v3\_xxreal\_0\ X0)\wedge(v1\_xreal\_0\ X0))\wedge ((\neg v3\_xxreal\_0\ X1)\wedge(v1\_xreal\_0\ X1)))\Rightarrow(\neg v3\_xxreal\_0\ (k3\_xcmplx\_0\ X0\ X1)) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2\_xxreal\_0\ X0)\wedge(v1\_xreal\_0\ X0))\wedge ((\neg v3\_xxreal\_0\ X1)\wedge(v1\_xreal\_0\ X1)))\Rightarrow(\neg v2\_xxreal\_0\ (k3\_xcmplx\_0\ X1\ X0)) \tag{9}$$

Assume the following.

$$v1\_xboole\_0\ k1\_xboole\_0 \tag{10}$$

Assume the following.

$$\neg v1\_xboole\_0\ k1\_numbers \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge((\neg v1\_xboole\_0\ X1)\wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ X0\ X1)\Rightarrow(m1\_subset\_1\ X2\ X0)) \tag{12}$$

Assume the following.

$$m1\_subset\_1\ k5\_numbers\ (k1\_zfmisc\_1\ k1\_numbers) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_rat\_1\ X0)\Rightarrow(v1\_int\_1\ (k2\_rat\_1\ X0)) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_rat\_1\ X0)\Rightarrow(m2\_subset\_1\ (k1\_rat\_1\ X0)\ k1\_numbers\ k5\_numbers) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_rat\_1\ X0)\Rightarrow(k2\_rat\_1\ X0 = k8\_real\_1\ (k1\_rat\_1\ X0)\ X0) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_rat\_1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ k1\_numbers\ k5\_numbers)\Rightarrow((X1 = k1\_rat\_1\ X0)\Leftrightarrow((X1\neq k6\_numbers)\wedge((\exists X2.\ (v1\_int\_1\ X2)\wedge(X0 = k6\_real\_1\ X2\ X1))\wedge(\forall X2.(v1\_int\_1\ X2)\Rightarrow (\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ k1\_numbers\ k5\_numbers)\Rightarrow((X0 = k6\_real\_1\ X2\ X3)\Rightarrow((X3 = k6\_numbers)\vee(r1\_xxreal\_0\ X1\ X3)))))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_xxreal\_0\ X0)\wedge((\neg v2\_xxreal\_0\ X0)\wedge(\neg v3\_xxreal\_0\ X0)))\Rightarrow((v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(v1\_xxreal\_0\ X0)) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_xxreal\_0\ X0)\wedge(v3\_xxreal\_0\ X0))\Rightarrow((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge((v1\_xxreal\_0\ X0)\wedge(\neg v2\_xxreal\_0\ X0))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xreal\_0\ X0)\Rightarrow(v1\_xxreal\_0\ X0) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_xxreal\_0\ X0)\wedge(v2\_xxreal\_0\ X0))\Rightarrow((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge((v1\_xxreal\_0\ X0)\wedge(\neg v3\_xxreal\_0\ X0))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xreal\_0\ X0)\Rightarrow(v1\_xcmplx\_0\ X0) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_int\_1\ X0)\Rightarrow(v1\_xreal\_0\ X0) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k5\_numbers)\Rightarrow(\neg v3\_xxreal\_0\ X0) \tag{24}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k1\_numbers)\Rightarrow(v1\_xreal\_0\ X0) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_rat\_1\ X0)\Rightarrow(v1\_xreal\_0\ X0) \tag{26}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v1\_rat\_1\ X0)\Rightarrow((k2\_rat\_1\ X0 = k6\_numbers)\Leftrightarrow(X0 = k6\_numbers))$$