t2_e_siec (TMY8vJ9k23eMaawUTwP5gPRMJuYa8ndr42K)

October 27, 2020

Let $v2\_e\_siec : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $g1\_e\_siec : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_xboole\_0 : \iota$ be given. Let $v3\_e\_siec : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_e\_siec : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_relat\_1\ X0) \Rightarrow ((k3\_relat\_1\ k1\_xboole\_0\ X0 = k1\_xboole\_0) \wedge (k3\_relat\_1\ X0\ k1\_xboole\_0 = k1\_xboole\_0)) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.r1\_tarski\ k1\_xboole\_0\ X0 \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(v1\_relat\_1\ X1) \Rightarrow (\forall X2.(v1\_relat\_1\ X2) \Rightarrow (((v2\_e\_siec\ (g1\_e\_siec\ X0\ X1\ X2)) \wedge ((v3\_e\_siec\ (g1\_e\_siec\ X0\ X1\ X2)) \wedge (l1\_e\_siec\ (g1\_e\_siec\ X0\ X1\ X2)))) \Leftrightarrow ((r1\_tarski\ X1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)) \wedge ((r1\_tarski\ X2\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X0)) \wedge ((k3\_relat\_1\ X1\ X1 = X1) \wedge ((k3\_relat\_1\ X1\ X2 = X1) \wedge ((k3\_relat\_1\ X2\ X2 = X2) \wedge ((k3\_relat\_1\ X2\ X1 = X2) \wedge ((k3\_relat\_1\ X1\ (k4\_xboole\_0\ X1\ (k4\_relat\_1\ X0)) = k1\_xboole\_0) \wedge (k3\_relat\_1\ X2\ (k4\_xboole\_0\ X2\ (k4\_relat\_1\ X0)) = k1\_xboole\_0)))))))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(v1\_relat\_1\ X0) \Rightarrow (v1\_relat\_1\ (k4\_xboole\_0\ X0\ X1)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$v1\_xboole\_0\ k1\_xboole\_0 \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (v1\_relat\_1\ X0) \tag{6}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v2\_e\_siec\ (g1\_e\_siec\ X0\ k1\_xboole\_0\ k1\_xboole\_0))\wedge$$
$$((v3\_e\_siec\ (g1\_e\_siec\ X0\ k1\_xboole\_0\ k1\_xboole\_0))\wedge(l1\_e\_siec$$
$$(g1\_e\_siec\ X0\ k1\_xboole\_0\ k1\_xboole\_0)))$$