t32_analort (TMaeK22Z11ixAaDrJ2FymDhDYY1dvXvdmDg)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_analort : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r3\_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v6\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1\ X0) \wedge (l1\_rlvect\_1\ X0))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X6.(m1\_subset\_1\ X6\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow ((r1\_analmetr\ X0\ X1\ X2) \Rightarrow ((r3\_analmetr\ X0\ X3\ X4\ X5\ X6\ X1\ X2) \Leftrightarrow ((r1\_analort\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4\ X5\ X6) \vee (r1\_analort\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4\ X6\ X5)))))))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v6\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1\ X0) \wedge (l1\_rlvect\_1\ X0))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X6.(m1\_subset\_1\ X6\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X7.(m1\_subset\_1\ X7\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (((r1\_analmetr\ X0\ X1\ X2) \wedge ((r3\_analmetr\ X0\ X3\ X4\ X5\ X6\ X1\ X2) \wedge (r3\_analmetr\ X0\ X3\ X4\ X5\ X7\ X1\ X2))) \Rightarrow (r3\_analmetr\ X0\ X3\ X4\ X6\ X7\ X1\ X2)))))))))) \tag{2}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v13\_algstr\_0\ X0)\wedge((v2\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v3\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v4\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v5\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v6\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v7\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v8\_rlvect\_1\ X0)\wedge(l1\_rlvect\_1\ X0))))))))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X6.(m1\_subset\_1\ X6\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X7.(m1\_subset\_1\ X7\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\neg(r1\_analmetr\ X0\ X1\ X2)\wedge((r1\_analort\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4\ X5\ X6)\wedge((r1\_analort\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4\ X5\ X7)\wedge((\neg r1\_analort\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4\ X6\ X7)\wedge(\neg r1\_analort\ X0\ X1\ X2\ X3\ X4\ X7\ X6))))))))))))$$