t32_fuzzy_1 (TMZywWnkzTWUgm-RLD6R8wwon6ZCnFn6ovm7)

October 27, 2020

Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_rcomp\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_numbers : \iota$ be given. Let $np\_\_1 : \iota$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_numbers : \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_fuzzy\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4\_fuzzy\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_fuzzy\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_fuzzy\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v5\_relat\_1\ X1\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1)) \wedge ((v1\_funct\_1\ X1) \wedge ((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k1\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers)))))) \Rightarrow (r1\_fuzzy\_1\ X1\ X1)) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v5\_relat\_1\ X1\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1)) \wedge ((v1\_funct\_1\ X1) \wedge ((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k1\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers)))))) \Rightarrow ((r1\_fuzzy\_1\ X1\ (k4\_fuzzy\_1\ X0)) \Rightarrow (r2\_funct\_2\ X0\ k1\_numbers\ X1\ (k4\_fuzzy\_1\ X0)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v5\_relat\_1\ X1\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1)) \wedge ((v1\_funct\_1\ X1) \wedge ((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k1\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers)))))) \Rightarrow (\forall X2.((v5\_relat\_1\ X2\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1)) \wedge ((v1\_funct\_1\ X2) \wedge ((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ k1\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers)))))) \Rightarrow ((r1\_fuzzy\_1\ (k1\_fuzzy\_1\ X0\ X1\ X2)\ X1) \wedge (r1\_fuzzy\_1\ X1\ (k2\_fuzzy\_1\ X0\ X1\ X2))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.(((v1\_funct\_1\ X2)\wedge ((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))))\wedge((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1))))))\Rightarrow((r2\_funct\_2\ X0\ X1\ X2\ X3)\Leftrightarrow(X2 = X3)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(((v5\_relat\_1\ X1\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1))\wedge((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers))))))\wedge((v5\_relat\_1\ X2\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1))\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers)))))))\Rightarrow(k2\_fuzzy\_1\ X0\ X1\ X1 = X1) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow((v5\_relat\_1\ (k4\_fuzzy\_1\ X0)\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1))\wedge((v1\_funct\_1\ (k4\_fuzzy\_1\ X0))\wedge((v1\_funct\_2\ (k4\_fuzzy\_1\ X0)\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ (k4\_fuzzy\_1\ X0)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers))))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(((v5\_relat\_1\ X1\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1))\wedge((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers))))))\wedge((v5\_relat\_1\ X2\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1))\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers)))))))\Rightarrow((v5\_relat\_1\ (k2\_fuzzy\_1\ X0\ X1\ X2)\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1))\wedge((v1\_funct\_1\ (k2\_fuzzy\_1\ X0\ X1\ X2))\wedge((v1\_funct\_2\ (k2\_fuzzy\_1\ X0\ X1\ X2)\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ (k2\_fuzzy\_1\ X0\ X1\ X2)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers))))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(((v5\_relat\_1\ X1\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1))\wedge((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers))))))\wedge((v5\_relat\_1\ X2\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1))\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers)))))))\Rightarrow(k2\_fuzzy\_1\ X0\ X1\ X2 = k2\_fuzzy\_1\ X0\ X2\ X1) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((v5\_relat\_1\ X1\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1))\wedge((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers))))))\Rightarrow(\forall X2.((v5\_relat\_1\ X2\ (k1\_rcomp\_1\ k6\_numbers\ np\_\_1))\wedge((v1\_funct\_1\ X2)\wedge((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ k1\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k1\_numbers))))))\Rightarrow((r2\_funct\_2\ X0\ k1\_numbers\ (k2\_fuzzy\_1\ X0\ X1\ X2)\ (k4\_fuzzy\_1\ X0))\Leftrightarrow((r2\_funct\_2\ X0\ k1\_numbers\ X1\ (k4\_fuzzy\_1\ X0))\wedge(r2\_funct\_2\ X0\ k1\_numbers\ X2\ (k4\_fuzzy\_1\ X0))))))$$