t36_bvfunc_1 (TMRNQxPvCZoi5rkuuCfeiY7556PT1LSimuY)

October 27, 2020

Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6\_margrel1 : \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k17\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_partit1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k14\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k16\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k13\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_eqrel\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1) \wedge ((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))) \Rightarrow (r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ (k16\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ (k6\_partit1\ X0))\ (k13\_bvfunc\_1\ X0\ X1))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1) \wedge ((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_eqrel\_1\ X2\ X0) \Rightarrow (r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ (k16\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2))\ (k17\_bvfunc\_1\ X0\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ X1)\ X2)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1) \wedge ((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))) \Rightarrow ((r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ (k13\_bvfunc\_1\ X0\ X1))\ (k14\_bvfunc\_1\ X0\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ X1))) \wedge (r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ (k14\_bvfunc\_1\ X0\ X1))\ (k13\_bvfunc\_1\ X0\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ X1))))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.(((v1\_funct\_1\ X2)\wedge ((v1\_funct\_2\ X2\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1)))))\wedge((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v1\_funct\_2\ X3\ X0\ X1)\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ X1))))))\Rightarrow((r2\_funct\_2\ X0\ X1\ X2\ X3)\Leftrightarrow(X2 = X3)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))))\Rightarrow(k1\_bvfunc\_1\ X0\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ X1) = X1) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(m1\_eqrel\_1\ (k6\_partit1\ X0)\ X0) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ X1))\wedge((v1\_funct\_2\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ X1)\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ (k1\_bvfunc\_1\ X0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1)))))\wedge(m1\_eqrel\_1\ X2\ X0)))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k17\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2))\wedge((v1\_funct\_2\ (k17\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2)\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ (k17\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(((v1\_funct\_1\ X1)\wedge((v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1)))))\wedge(m1\_eqrel\_1\ X2\ X0)))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k16\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2))\wedge((v1\_funct\_2\ (k16\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2)\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ (k16\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ X2)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X1)\wedge(\\(v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (\\k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k14\_bvfunc\_1\\X0\ X1))\wedge((v1\_funct\_2\ (k14\_bvfunc\_1\ X0\ X1)\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\\(k14\_bvfunc\_1\ X0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1)))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X1)\wedge(\\(v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (\\k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1))))))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k13\_bvfunc\_1\\X0\ X1))\wedge((v1\_funct\_2\ (k13\_bvfunc\_1\ X0\ X1)\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\\(k13\_bvfunc\_1\ X0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1)))))) \tag{11}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1\_funct\_1\ X1)\wedge(\\(v1\_funct\_2\ X1\ X0\ k6\_margrel1)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (\\k2\_zfmisc\_1\ X0\ k6\_margrel1)))))\Rightarrow(r2\_funct\_2\ X0\ k6\_margrel1\ (\\k17\_bvfunc\_1\ X0\ X1\ (k6\_partit1\ X0))\ (k14\_bvfunc\_1\ X0\ X1)))$$