t48_arytm_3 (TMWbcDR-tiZkqjRn9qgmzeJHk5F2aeWCTVFJ)

October 27, 2020

Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5\_arytm\_3 : \iota$ be given. Let $k10\_arytm\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k11\_arytm\_3 : \iota$ be given. Let $v3\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8\_arytm\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_xboole\_0 : \iota$ be given. Let $np\_\_1 : \iota$ be given. Let $k11\_ordinal2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9\_ordinal3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7\_arytm\_3 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4\_ordinal1 : \iota$ be given. Let $k6\_arytm\_3 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((v3\_ordinal1\ X0) \wedge (v7\_ordinal1\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ ((v3\_ordinal1\ X1) \wedge (v7\_ordinal1\ X1)) \Rightarrow ((k8\_arytm\_3\ k1\_xboole\_0\ X0 = k1\_xboole\_0) \wedge (k8\_arytm\_3\ X1\ np\_\_1 = X1))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v3\_ordinal1\ X0) \Rightarrow (k11\_ordinal2\ k1\_xboole\_0\ X0 = k1\_xboole\_0) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((v3\_ordinal1\ X0) \wedge (v7\_ordinal1\ X0)) \wedge ((v3\_ordinal1\ X1) \wedge (v7\_ordinal1\ X1))) \Rightarrow (k9\_ordinal3\ X0\ X1 = k11\_ordinal2\ X0\ X1) \tag{3}$$

Assume the following.

$$k11\_arytm\_3 = k1\_xboole\_0 \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((v3\_ordinal1\ X0) \wedge (v7\_ordinal1\ X0)) \wedge ((v3\_ordinal1\ X1) \wedge (v7\_ordinal1\ X1))) \Rightarrow ((v3\_ordinal1\ (k11\_ordinal2\ X0\ X1)) \wedge (v7\_ordinal1\ (k11\_ordinal2\ X0\ X1))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\neg v1\_xboole\_0\ (k2\_tarski\ X0\ X1) \tag{6}$$

Assume the following.

$$v1\_xboole\_0\ k1\_xboole\_0 \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k5\_arytm\_3)\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k7\_arytm\_3\ X0)\ k4\_ordinal1) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k5\_arytm\_3)\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k6\_arytm\_3\ X0)\ k4\_ordinal1) \tag{9}$$

Assume the following.

$$m1\_subset\_1\ k11\_arytm\_3\ k5\_arytm\_3 \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k5\_arytm\_3)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ k4\_ordinal1)\Rightarrow(((X0\in k4\_ordinal1)\Rightarrow((X1=k6\_arytm\_3\ X0)\Leftrightarrow(X1=X0)))\wedge((\neg X0\in k4\_ordinal1)\Rightarrow((X1=k6\_arytm\_3\ X0)\Leftrightarrow(\exists X2.((v3\_ordinal1\ X2)\wedge(v7\_ordinal1\ X2))\wedge(X0=k4\_tarski\ X1\ X2))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.k4\_tarski\ X0\ X1=k2\_tarski\ (k2\_tarski\ X0\ X1)\ (k1\_tarski\ X0) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k5\_arytm\_3)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ k5\_arytm\_3)\Rightarrow(k10\_arytm\_3\ X0\ X1=k8\_arytm\_3\ (k9\_ordinal3\ (k6\_arytm\_3\ X0)\ (k6\_arytm\_3\ X1))\ (k9\_ordinal3\ (k7\_arytm\_3\ X0)\ (k7\_arytm\_3\ X1)))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((v3\_ordinal1\ X0)\wedge(v7\_ordinal1\ X0))\wedge((v3\_ordinal1\ X1)\wedge(v7\_ordinal1\ X1)))\Rightarrow(k9\_ordinal3\ X0\ X1=k9\_ordinal3\ X1\ X0) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k4\_ordinal1)\Rightarrow(v7\_ordinal1\ X0) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(v7\_ordinal1\ X0) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7\_ordinal1\ X0)\Rightarrow(v3\_ordinal1\ X0) \tag{17}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k5\_arytm\_3) \Rightarrow (k10\_arytm\_3\ X0\ k11\_arytm\_3 = k11\_arytm\_3)$$