t5_pdiff_2 (TMZ5SXU58tzeDQoeQMzRxh4w15iyRdXvocn)

October 27, 2020

Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_euclid : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $np\_\_2 : \iota$ be given. Let $k1\_numbers : \iota$ be given. Let $m2\_finseq\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_fdiff\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_pdiff\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $np\_\_1 : \iota$ be given. Let $r3\_pdiff\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_pdiff\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_seq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_card\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_xxreal\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5\_numbers : \iota$ be given. Let $m1\_finseq\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4\_ordinal1 : \iota$ be given. Let $v7\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6\_pdiff\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$(k1\_relset\_1\ (k1\_euclid\ np\_\_2)\ (k1\_pdiff\_1\ np\_\_1\ np\_\_2) = k1\_euclid\ np\_\_2) \wedge ((k2\_relset\_1\ k1\_numbers\ (k1\_pdiff\_1\ np\_\_1\ np\_\_2) = k1\_numbers) \wedge (\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k1\_numbers) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ k1\_numbers) \Rightarrow (k1\_seq\_1\ (k1\_pdiff\_1\ np\_\_1\ np\_\_2)\ (k10\_finseq\_1\ X0\ X1) = X0)))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.((v3\_card\_1\ X1\ np\_\_2) \wedge (m2\_finseq\_1\ X1\ X0)) \Rightarrow (\exists X2.(m1\_subset\_1\ X2\ X0) \wedge (\exists X3.(m1\_subset\_1\ X3\ X0) \wedge (X1 = k10\_finseq\_1\ X2\ X3)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$((v2\_xxreal\_0\ np\_\_2) \wedge (m2\_subset\_1\ np\_\_2\ k1\_numbers\ k5\_numbers)) \wedge ((m1\_subset\_1\ np\_\_2\ k5\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1\ np\_\_2\ k1\_numbers)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\neg v1\_xboole\_0\ np\_\_2 \tag{4}$$

Assume the following.

$$((v2\_xxreal\_0\ np\_\_1)\wedge(m2\_subset\_1\ np\_\_1\ k1\_numbers\ k5\_numbers))\wedge ((m1\_subset\_1\ np\_\_1\ k5\_numbers)\wedge(m1\_subset\_1\ np\_\_1\ k1\_numbers)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_finseq\_2\ X1\ X0)\Rightarrow(\forall X2.(m2\_finseq\_2\ X2\ X0\ X1)\Leftrightarrow(m1\_subset\_1\ X2\ X1)) \tag{6}$$

Assume the following.

$$k5\_numbers = k4\_ordinal1 \tag{7}$$

Assume the following.

$$\neg v1\_xboole\_0\ k1\_numbers \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_finseq\_2\ X1\ X0)\Rightarrow(\forall X2.(m2\_finseq\_2\ X2\ X0\ X1)\Rightarrow(m2\_finseq\_1\ X2\ X0)) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7\_ordinal1\ X0)\Rightarrow(m1\_finseq\_2\ (k1\_euclid\ X0)\ k1\_numbers) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m2\_subset\_1\ X0\ k1\_numbers\ k5\_numbers)\Rightarrow(\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ k1\_numbers\ k5\_numbers)\Rightarrow(\forall X2.((v1\_funct\_1\ X2)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k1\_euclid\ X0)\ k1\_numbers))))\Rightarrow(\forall X3.(m2\_finseq\_2\ X3\ k1\_numbers\ (k1\_euclid\ X0))\Rightarrow(k1\_pdiff\_2\ X0\ X1\ X2\ X3 = k1\_partfun1\ k1\_numbers\ (k1\_euclid\ X0)\ (k1\_euclid\ X0)\ k1\_numbers\ (k6\_pdiff\_1\ X0\ X1\ X3)\ X2)))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(m2\_subset\_1\ X0\ k1\_numbers\ k5\_numbers))\Rightarrow (\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ k1\_numbers\ k5\_numbers)\Rightarrow(\forall X2.((v1\_funct\_1\ X2)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k1\_euclid\ X0)\ k1\_numbers))))\Rightarrow(\forall X3.(m2\_finseq\_2\ X3\ k1\_numbers\ (k1\_euclid\ X0))\Rightarrow((r3\_pdiff\_1\ X0\ X1\ X2\ X3)\Leftrightarrow(r1\_fdiff\_1\ (k1\_partfun1\ k1\_numbers\ (k1\_euclid\ X0)\ (k1\_euclid\ X0)\ k1\_numbers\ (k6\_pdiff\_1\ X0\ X1\ X3)\ X2)\ (k1\_seq\_1\ (k1\_pdiff\_1\ X1\ X0)\ X3)))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k4\_ordinal1)\Rightarrow(v7\_ordinal1\ X0) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7\_ordinal1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_euclid\ X0))\Rightarrow(v3\_card\_1\ X1\ X0)) \tag{14}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v1\_funct\_1\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X0\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k1\_euclid\ np\_\_2)\ k1\_numbers))))\Rightarrow(\forall X1.(m2\_finseq\_2\ X1\ k1\_numbers\ (k1\_euclid\ np\_\_2))\Rightarrow((\exists X2.(m1\_subset\_1\ X2\ k1\_numbers)\wedge(\exists X3.(m1\_subset\_1\ X3\ k1\_numbers)\wedge((X1 = k10\_finseq\_1\ X2\ X3)\wedge(r1\_fdiff\_1\ (k1\_pdiff\_2\ np\_\_2\ np\_\_1\ X0\ X1)\ X2))))\Leftrightarrow(r3\_pdiff\_1\ np\_\_2\ np\_\_1\ X0\ X1)))$$