t9_pdiff_2 (TMUBhkpoi6fj6cYBSbvhbWsJCa526ita6Tu)

October 27, 2020

Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_euclid : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $np\_\_2 : \iota$ be given. Let $k1\_numbers : \iota$ be given. Let $m2\_finseq\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r3\_pdiff\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $np\_\_1 : \iota$ be given. Let $k10\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_rcomp\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_pdiff\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3\_fdiff\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_fdiff\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9\_real\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_seq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7\_real\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_fdiff\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_xxreal\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5\_numbers : \iota$ be given. Let $m1\_finseq\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4\_ordinal1 : \iota$ be given. Let $v7\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_xreal\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_funct\_1\ X0) \wedge (m1\_subset\_1\ X0\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k1\_euclid\ np\_\_2)\ k1\_numbers)))) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_finseq\_2\ X1\ k1\_numbers\ (k1\_euclid\ np\_\_2)) \Rightarrow ((\exists X2.(m1\_subset\_1\ X2\ k1\_numbers) \wedge (\exists X3.(m1\_subset\_1\ X3\ k1\_numbers) \wedge ((X1 = k10\_finseq\_1\ X2\ X3) \wedge (r1\_fdiff\_1\ (k1\_pdiff\_2\ np\_\_2\ np\_\_1\ X0\ X1)\ X2)))) \Leftrightarrow (r3\_pdiff\_1\ np\_\_2\ np\_\_1\ X0\ X1))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$((v2\_xxreal\_0\ np\_\_2) \wedge (m2\_subset\_1\ np\_\_2\ k1\_numbers\ k5\_numbers)) \wedge ((m1\_subset\_1\ np\_\_2\ k5\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1\ np\_\_2\ k1\_numbers)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$((v2\_xxreal\_0\ np\_\_1) \wedge (m2\_subset\_1\ np\_\_1\ k1\_numbers\ k5\_numbers)) \wedge ((m1\_subset\_1\ np\_\_1\ k5\_numbers) \wedge (m1\_subset\_1\ np\_\_1\ k1\_numbers)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_finseq\_2\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_finseq\_2\ X2\ X0\ X1) \Leftrightarrow (m1\_subset\_1\ X2\ X1)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$k5\_numbers = k4\_ordinal1 \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((m1\_subset\_1\ X0\ k5\_numbers)\wedge((m1\_subset\_1\ X1\ k5\_numbers)\wedge(((v1\_funct\_1\ X2)\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k1\_euclid\ X0)\ k1\_numbers))))\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_euclid\ X0)))))\Rightarrow((v1\_funct\_1\ (k1\_pdiff\_2\ X0\ X1\ X2\ X3))\wedge(m1\_subset\_1\ (k1\_pdiff\_2\ X0\ X1\ X2\ X3)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ k1\_numbers\ k1\_numbers)))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7\_ordinal1\ X0)\Rightarrow(m1\_finseq\_2\ (k1\_euclid\ X0)\ k1\_numbers) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_funct\_1\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X0\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ k1\_numbers\ k1\_numbers))))\Rightarrow(\forall X1.(v1\_xreal\_0\ X1)\Rightarrow((r1\_fdiff\_1\ X0\ X1)\Leftrightarrow(\exists X2.(m1\_rcomp\_1\ X2\ X1)\wedge((r1\_tarski\ X2\ (k1\_relset\_1\ k1\_numbers\ X0))\wedge(\exists X3.((v1\_funct\_1\ X3)\wedge((v3\_fdiff\_1\ X3)\wedge(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ k1\_numbers\ k1\_numbers)))))\wedge(\exists X4.((v1\_funct\_1\ X4)\wedge((v2\_fdiff\_1\ X4)\wedge(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ k1\_numbers\ k1\_numbers)))))\wedge(\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ k1\_numbers)\Rightarrow((X5\in X2)\Rightarrow(k9\_real\_1\ (k1\_seq\_1\ X0\ X5)\ (k1\_seq\_1\ X0\ X1) = k7\_real\_1\ (k1\_seq\_1\ X3\ (k9\_real\_1\ X5\ X1))\ (k1\_seq\_1\ X4\ (k9\_real\_1\ X5\ X1)))))))))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k4\_ordinal1)\Rightarrow(v7\_ordinal1\ X0) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_subset\_1\ X0\ k1\_numbers)\Rightarrow(v1\_xreal\_0\ X0) \tag{10}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v1\_funct\_1\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X0\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ (k1\_euclid\ np\_\_2)\ k1\_numbers))))\Rightarrow(\forall X1.(m2\_finseq\_2\ X1\ k1\_numbers\ (k1\_euclid\ np\_\_2))\Rightarrow((r3\_pdiff\_1\ np\_\_2\ np\_\_1\ X0\ X1)\Leftrightarrow(\exists X2.(m1\_subset\_1\ X2\ k1\_numbers)\wedge(\exists X3.(m1\_subset\_1\ X3\ k1\_numbers)\wedge((X1 = k10\_finseq\_1\ X2\ X3)\wedge(\exists X4.(m1\_rcomp\_1\ X4\ X2)\wedge((r1\_tarski\ X4\ (k1\_relset\_1\ k1\_numbers\ (k1\_pdiff\_2\ np\_\_2\ np\_\_1\ X0\ X1)))\wedge(\exists X5.((v1\_funct\_1\ X5)\wedge((v3\_fdiff\_1\ X5)\wedge(m1\_subset\_1\ X5\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ k1\_numbers\ k1\_numbers)))))\wedge(\exists X6.((v1\_funct\_1\ X6)\wedge((v2\_fdiff\_1\ X6)\wedge(m1\_subset\_1\ X6\ (k1\_zfmisc\_1\ (k2\_zfmisc\_1\ k1\_numbers\ k1\_numbers)))))\wedge(\forall X7.(m1\_subset\_1\ X7\ k1\_numbers)\Rightarrow((X7 \in X4)\Rightarrow(k9\_real\_1\ (k1\_seq\_1\ (k1\_pdiff\_2\ np\_\_2\ np\_\_1\ X0\ X1)\ X7)\ (k1\_seq\_1\ (k1\_pdiff\_2\ np\_\_2\ np\_\_1\ X0\ X1)\ X2) = k7\_real\_1\ (k1\_seq\_1\ X5\ (k9\_real\_1\ X7\ X2))\ (k1\_seq\_1\ X6\ (k9\_real\_1\ X7\ X2))))))))))))))$$